

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: imidakloprid 200 g/l

Formulacija: Uljna disperzija (OD)

Primena:

- Koristi se u usevu **paprike** za suzbijanje **lisnih vaši** (*Aphididae*) u količini **0,2-0,25 l/ha** tretiranjem pri pojavi prvih kolonija lisnih vaši pa do sedam dana pred berbu.

U svetu se ovaj preparat koristi i za suzbijanje:

- **Krompirove zlatice** (*Leptinotarsa decemlineata*) u usevu **krompira**, i količini **0,2-0,3 l/ha** tretiranjem imaga i larve od prvog do trećeg stupnja;
- **Tripsa** (*Thrips tabaci*) u zasadima **duvana**, u količini **0,5-0,6 l/ha**, tretiranjem nakon pojave imaga;
- **Lisne vaši hmelja** (*Phorodon humuli*) u zasadima **hmelja**, u količini **0,5-0,6 l/ha** tretiranjem kad je hmelj visine 3m;
- **Lisne vaši** (*Aphididae*) i **tripsa** (*Thripidae*) u zasadima **jabuke, kruške, šljive, trešnje i breskve**, u koncentraciji **0,025%**;
- **Lisnih minera** (*Lyonetidae*) u zasadima **jabuke**, u koncentraciji **0,0375-0,05%**

Preparat se primenjuje folijarno uz utrošak vode za povrće 200-400 l/ha a za voće 600-1000l/ha.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

- Maksimalni broj tretiranja na istoj povrsini dva do tri puta u toku godine.
- Primena preparata u skladu sa preporukama, ne dovodi do fitotoksičnih efekata na biljkama
- Ispoljava odličnu efikasnost i na **lukovu muvu, belu leptirastu vaš** i različite vrste vaši na povrtarskim i rataskim usevima.

GATGO 20 OD je insekticid fomulisan kao uljna disperzija (OD), savremeni način formulisanja, što omogućava veću postojanost preparata na listu, snižava površinski napon te je bolja pokrovost lista i samim tim i bolja efikasnost (i kod kontaktnog i digestivnog delovanja). Nije potrebno dodavati okvašivač čak ni pri mešanju sa drugim preparatima u WG formulaciji.

Karenca: Paprika 7 dana

Pakovanje: 50 ml; 200 ml; 1l

