

# MEZZO 60 WG

H E R B I C I D

*Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu*

**Aktivna materija:** 600 g/kg metsulfuron metil

**Formulacija:** Vododisperzibilne granule (WG)

## Oсобине и начин delovanja:

Mezzo 60 WG je herbicid iz grupe sulfonil urea. Usvaja se i preko lista i preko korena zahvaljujući čemu se brzo rasprostire po celoj biljci. Svojim delovanjem sprečava deobu ćelija u tačkama porasta izdanaka i korena korovskih biljaka.

## Primena:

U usevu pšenice i ječma od faze tri lista do pojave zastavičara (13-39 BBCH skala), u količini: **10 g/ha** sam preparat Mezzo 60 WG ili sa okvašivačem.

Zbog proširenja spektra delovanja može se mešati sa sredstvima na bazi: fluroksipira, mekoprop-a i dikambe.

**Utrošak vode:** 200-400 l/ha

## Spektar delovanja

Vidovčica crvena	<i>Anagallis arvensis</i>
Dvornici	<i>Polygonum spp.</i>
Gorušica	<i>Sinapis arvensis</i>
Kravljva trava	<i>Thlaspi arvense</i>
Palamida	<i>Cirsium arvense</i>
Pepeljuga obična	<i>Chenopodium album</i>
Pepeljuga sročislana	<i>Chenop. hybridum</i>
Žavornjak obični	<i>Consolida regalis</i>
Bulka obična	<i>Papaver rhoeas</i>
Crvena kopriva	<i>Lamium purpureum</i>
Stisnuša kravljva	<i>Thlaspi arvense</i>
Bulka	<i>Papaver rhoeas</i>
Divlja ljubičica	<i>Viola arvensis</i>
Čestoslavica poljska	<i>Veronica arvensis</i>

Slabo suzbija jednogodišnje korove kao što su: broćika lepuša (*Galium aparine*).





#### Preporuke i napomene vezane za primenu:

- Mezzo 60 WG se ne sme mešati sa herbicidima iz grupe sulfonilurea i insekticidima na bazi hlorpirifosa.
- Mezzo 60 WG ispoljava najveću efikasnost ako se primeni u početnim fazama porasta korova.
- Prvi simptomi delovanja vidljivi su nakon 5-10 dana od primene preparata. U slučaju preoravanja useva na tretiranim površinama se mogu sejati samo jara strna žita uz prethodnu obradu zemljišta.



**Agrimatco**

#### Karenca:

Obezbeđena vremenom primene.

**Pakovanje: 10 g**