

Ograničeno sistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: abamektin 18 g/l
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način delovanja:

- Abamektin se dobija fermentacijom iz gljive *Streptomyces avermitilis*, prirodnog stanovnika zemljišta.
- Nesistemični (kontaktni) akaricid i insekticid sa ograničenom sistemičnom aktivnošću.
- Ispoljava translaminarno kretanje u biljci.
- U grinjama i insektima dovodi do oslobađanja inhibitora nervne transmisije, uzrokujući paralizu.

Primena:

Preparat **ARMADA** koristi se:

- za suzbijanje **crvene voćne grinje** (*Panonychus ulmi*) u zasadu **jabuke**, u koncentracijama **0,05%-0,1%** (5 - 10 ml u 10 litara vode),
- za suzbijanje **običnog pauka** (*Tetranychus urticae*) u usevu **kraštavca**, u količini **0,5-1 l/ha**.
- za suzbijanje **kruškine buve** (*Psylla pyri*) u zasadu **kruške**, u koncentracijama **0,05%-0,1%** (5 - 10 ml u 10 litara vode)

Preporuke i napomene vezane za primenu:

- Tretiranje se vrši na početku ili tokom vegetacije, a pri pojavi prvih pokretnih formi grinja i insekata.
- Preparat ima znatno širi spektar delovanja: koristi se i za suzbijanje **tripsa** u povrću, **grinja** na mnogim drugim kulturama, **krompirove zlatice** itd.
- Maksimalno delovanje preparat postiže 3-4 dana nakon primene, međutim, štetni insekti odmah nakon usvajanja preparata nisu više u mogućnosti da ugroze usev jer prestaju sa ishranom i bivaju paralizovani.
- Radi boljeg delovanja preparatu se može dodati 0,25% mineralnog ulja. Ova kombinacija se ne sme primeniti 3 dana pre i 3 dana posle prskanja kruške fungicidima na bazi sumpora ili kaptana.
- Ispoljava dobro delovanje i na nižim temperaturama.
- Ispoljava dugotrajno delovanje.
- Preparat je otrovan za pčele i ne sme se koristiti u vreme cvetanja.
- Može se mešati sa većinom drugih pesticida.

Karenca: 14 dana za jabuku i krušku, 7 dana u povrću

Pakovanje: 50 ml ; 1l

