


# Bellis®

Pridržavati se uputstva  
za upotrebu da bi se  
izbegli rizici po zdravlje  
ljudi i životnu sredinu.

Bellis® je sistemični  
fungicid sa preventivnim  
delovanjem, u obliku  
vododisperznih granula  
(WG). Primjenjuje se u  
zasadima: **jabuke** za  
suzbijanje prouzrokovaca  
pepelnice jabuke, truleži  
plodova i čadave pegavosti  
lišća i krastavosti plodova  
**jabuke i kruške** za  
suzbijanje prouzrokovaca  
čadave pegavosti lišća i  
krastavosti plodova kruške.



810900000RS1104-Serbia

® = zaštićeni znak firme BASF

1 kg



# Bellis®

**PRIMENA:** Bellis® je sistemični fungicid sa preventivnim delovanjem. Primjenjuje se folijarno, prskanjem ili orosavanjem, **u zasadu jabuke** za suzbijanje prouzrokovaca oboljenja: pepelnice jabuke (*Podosphaera leucotricha*), truleži plodova (*Monilinia spp*) i čadave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (*Venturia inaequalis*) i u zasadu kruške za suzbijanje prouzrokovaca čadave pegavosti lišća i krastavosti plodova kruške (*Venturia pirina*).

**Vreme primene :**

Za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice jabuke (*Podosphaera leucotricha*): tokom vegetacije (BBCH 54-85), i to preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje.

Za suzbijanje prouzrokovaca truleži plodova (*Monilinia spp*) primjenjuje se tokom zrenja (faza 81-87 BBCH skale), preventivno.

Za suzbijanje prouzrokovaca čadave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (*Venturia inaequalis*) tokom vegetacije (BBCH 54-85), i to preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje.

Za suzbijanje prouzrokovaca i prouzrokovaca čadave pegavosti lišća i krastavosti plodova kruške (*Venturia pirina*) tokom vegetacije (BBCH 54-85), i to preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje.

**Količina primene:** 0,8 kg/ha (8 g na 100 m<sup>2</sup>).

**Utrošak vode:** 1000 L/ha ( 10 L na 100 m<sup>2</sup> ).

**Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini : Tri puta.**

**Napomene:** Ne prskati po jakoj vrućini niti po vetru.Zbog moguće rezistentnosti jabuke i kruške na Qol-fungicide u kritičnom periodu (faza 56/59-71/73 BBCH skale) voditi računa da njihov ukupan broj tretiranja ne pređe tri puta u toku jedne vegetacione sezone.

**Negativno delovanje:**

Na biljke: Nema negativnih delovanja.

Na organizme u vodi (otrovnost): Veoma otrovan za vodene organizme. Sprečiti dospevanje preparata u vode (vodotoci, jezera, bunari, izvorišta voda i vodosnabdevanja) i kanalizacionu mrežu. Može prouzrokovati dugotrajna neženjena dejstva na vodenu sredinu.

Na vode (kontaminacija): Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i spričiti kontaminaciju vode (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda), tretirajući najmanje 20 metara udaljeno od njih.

**Mešanje sa drugim pesticidima**

Kompatibilnost (mogućnost mešanja): preparat Bellis se bez problema meša sa većinom insekticida i fungicida. Ne sme se mešati sa izrazito alkalnim preparatima.

**Primena iz vazduhoplova:** Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

**Karenca:** 7 dana za jabuku i krušku

**Radna karenca:** Do sušenje depozita

**Zaštitna oprema:** Zaštita disajnih puteva: Odgovarajuća zaštita od udisanja pri višim koncentracijama ili pri dužem delovanju. Filter za čestice sa srednje velikom mogućnošću zadržavanja čvrstih i tečnih čestica. Zaštita za ruke:

Odgovarajuće zaštitne rukavice otporne na hemikalije i pri dužem direktnom kontaktu: npr. nitril kaučuk (0,4mm), hlorpren kaučuk (0,5mm), butil kaučuk. Zaštita za oči:

zaštitne naočare sa štitnicima sa strane. Zaštita tela: Sredstvo zaštite treba odabrat u zavisnosti od delatnosti i mogućeg delovanja npr. zaštitna kecelja, čizme, zaštitno odelo. Za vreme rada ne sme se jesti, piti, niti pušiti. Posle završetka rada, ruke i lice dobro oprati vodom i sapunom, i istuširati se.

### **Simptomi trovanja, ukazivanje prve pomoći lečenje:**

Od simptoma trovanja mogu se javiti malaksalost, mučnina, gadenje, povraćanje, prolivi, ubrzano disanje, pospanost, glavobolja, vrtoglavica i nesiguran hod. U kontaktu sa očima može da izazove crvenilo i suzenje.

Prva pomoć: kod peroralnog trovanja izazivati povraćanje. U slučaju inhalacije potrebno je prekinuti ekspoziciju. Kod perkutanih trovanja se preporučuje kupanje i presvlačenje. Ukoliko dospe u oko isprati obilno čistom vodom.

Lečenje: lavaža želuca nazogastričnom sondom, medicinski ugalj (30 g), simptomatska terapija, infuzioni rastvori, a po potrebi i mere kardiopulmonalne reanimacije. U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent mogu konsultovali toksikologa u Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011/3608-440, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.

**Mere u slučaju nezgode u zatvorenoj prostoriji:** u slučaju da ima povredenih, odmah ih izneti iz prostorije i ukazati im prvu pomoć do dolaska lekara.

**Zaštitne mere u slučaju nezgode kod prevoza:** odmah osigurati mesto nesreće znakovima i obavestiti policiju, stručne službe i po potrebi vatrogasce. Do njihovog dolaska, koliko je moguće lokalizovati sredstvo da se ne razliva po zemlji i da ne dospeva u vodu.

**Skladištenje:** Preparat skladištiti u originalnom zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od ljudske i stočne hrane, na prohладном i suvom mestu, pod ključem, van domaćaja dece. Prodaja je dozvoljena samo u originalnom pakovanju proizvođača.

**Higijena životne sredine i uništavanje ambalaže:** Oruđa, depozitore i pribor oprati vrućom vodom, kojoj se doda 1-2% rastvora sode za pranje. Na kraju sve još jednom isprati hladnom vodom. Prazna ambalaža ni ostaci sredstva ne smeju dospeti u tlo niti u vodu, niti se smeju zakopati u zemlju. Ispražnjenu ambalažu potrebno je još jednom dobro protresti da se do kraja isprazni i zatim probušiti na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

**Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristi u neke druge svrhe!**

**Garancija kvaliteta proizvoda:** brižljivim ispitivanjem je dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje uputstva za upotrebu. Obzirom da se skladištenje i primena nalaze van našeg uticaja i da mi ne možemo predvideti sve okolnosti koje na to utiču, isključujemo svaku odgovornost za eventualne štete od nepravilnog skladištenja i primene.