

# GRINGO 75 WG

## FORMULACIJA:

Vododisperzibilne granule (WG)

## AKTIVNA MATERIJA:

Tribenuron-metil 750 g/kg

## PRIMENA:

Selektivni translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u usevu **pšenice** i **suncokreta** (tolerantan na tribenuron-metil).

- U usevu **pšenice** se primenjuje folijarno kada je pšenica u fenofazi od tri lista do pojave 2 kolanca (BBCH 13-32), a korovi od kotiledona do 6 listova u količini primene **15 g/ha** (0,15 g/100 m<sup>2</sup>) + 0,1% okvašivača, tretiranjem kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 prava lista, u uslovima toplog i vlažnog vremena; **20 g/ha** (0,2 g/100 m<sup>2</sup>) + 0,1% okvašivača, tretiranjem kada su korovi u fazi 4-6 listova, u uslovima hladnjeg i suvog vremena (uslovi manje povoljni za delovanje herbicida); **25 g/ha** (0,25 g/100 m<sup>2</sup>) + 0,1% okvašivača, za suzbijanje palamide (*Cirsium arvense*), tretiranjem kada je korov u fazi 2-6 listova.
- U usevu **suncokreta** se primenjuje folijarno kada je suncokret u fazi od 2-8 listova (BBCH 12-18) a korovi u fazi 2-4 lista, u količini primene **30 g/ha** + 0,1% okvašivača.

## SPEKTAR DELOVANJA:

Preparat **Gringo 75 WG** **dobro suzbija** sledeće širokolisne korove: štir (*Amaranthus retroflexus*),

poljski prstenak (*Anthemis arvensis*), smrduša obična (*Bifora radians*), tarčužak (*Capsella bursa-pastoris*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcočrvena (*Chenopodium hybridum*), palamida (*Cirsium arvense*), žavornjak (*Consolida regalis*), mrkva divlja (*Daucus carota*), tatula (*Datura stramonium*), lubeničarka (*Hibiscus trionum*), mrtva kopriva njivska (*Lamium amplexicaule*), kamilica bezmirisna (*Matricaria inodora*), bulka (*Papaver rhoeas*), rijavski ljutić (*Ranunculus arvensis*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), mišjakinja (*Stellaria media*), ljubičica poljska (*Viola arvensis*) i boca obična (*Xanthium strumarium*); **slabije suzbija:** poponac (*Convolvulus arvensis*), broćiku lepušu (*Galium aparine*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), čestoslavici poljsku (*Veronica hederifolia*).

## MEHANIZAM DELOVANJA:

Aktivna materija tribenuron-metil pripada sulfonilureama. Apsorbuje se korenom i folijarno i translocira po svim delovima biljke sprovodnim sudovima ksilema i floema. Zaustavlja deobu ćelija inhibirajući biosintezu esencijalnih aminokiselina izoleucina, leucina i valina. Simptomi se pojavljuju u vidu hloroze i nekroza meristemskih tkiva, a zatim dolazi do potpune folijarne hloroze i nekroze.

## NAPOMENE:

Utrošak vode je 200-400 L/ha (2-4 L na 100 m<sup>2</sup>). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom. Tretirati ledjnim i traktorskim prskalicama. Tretiranje iz vazduhoplova **nije** dozvoljeno. Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje preparata

na sve susedne širokolisne useve ili zemljište pripremljeno za njihovu setvu.

#### KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

#### PAKOVANJE:

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

