



HERBOCID	Pinus TKI
<p><b>herbicid</b>            Aktivna materija: 460 g/l 2,4 D            Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)            Pakovanje: 1 l, 25 l            Način delovanja: selektivni, hormonalni i translokacioni herbicid.</p>	
<p>Registrovano u programu zaštite: žita, kukuruz, livada, pašnjak</p>	

**Primena:** Selektivni, translokacioni, hormonalni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova kao što su: poljska gorušica (*Sinapis arvensis*), obična rusomača (*Capsella bursa-pastoris*), poljski osjak (*Cirsium arvense*), loboda (*Chenopodium spp.*), poljski slak (*Convolvulus arvensis*) u usevima:

**strnih žita** (izuzev ovsu) u količini:

**-1,5 - 2,5 l/ha** od sredine bokorenja do formiranja prvog kolena (faze F, G i H po KB ili 29,30,31 po BBCH skali).

**merkantilnog i silažnog kukuruza** (u fazi 13,14 po BBCH skali) u količini:

**-1,5 - 2,5 l/ha** kada kukuruz ima 3 - 5 lista i dostigne visinu 15 - 20 cm.

**livada i pašnjaka** (bez leguminoza) u količini:

**-2,5-3 l/ha** (25-30 ml na 100 m<sup>2</sup>) u fazi intenzivnog porasta ili posle prvog otkosa, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

Tretiranje se vrši po suvom, tihom i umereno toplom vremenu, kada su dnevne temperature između 5-25°C, i kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva.

Navedene količine sredstva primenjuju se uz 200 - 400 l vode/ha (2 - 4 l/100 m<sup>2</sup>).

**Karenca (u danima):**

28 dana za livade i pašnjake, a za ostale useve osigurana je vremenom primene.

Na tretiranim površinama, najmanje 28 dana od primene, ne dozvoliti pristup stoci, niti kositi travu za ishranu stoke.