



AM AGRO d.o.o.
a part of AGRIMATCO group

JOKER - metribuzin 70% WG

Herbicid za suzbijanje sjemenskih (jednogodišnjih) korova u krumpiru, rajčici, soji i lucerni
Djelatna tvar: metribuzin 70%

Formulacija : samodispergirajuće granule (WG)

Otrovnost: III skupina otrova

Karenca: 42 dana za krumpir i rajčicu. Osigurana je vremenom pimjene u soji i lucerni.

Primjena:

U krumpiru

-nakon sadnje a prije nicanja krumpira, u količini 0,75-1,5 kg/ha, i to :

- 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na lakisim tlima
- 1,0 kg/ha (10 g na 100 m²) na srednje teškim tlima
- 1,5 kg/ ha (15 g na 100 m²) na teškim i humusom bogatim tlima

- nakon nicanja krumpira, kad krumpir naraste na 5-10cm visine, tj.nakon što razvije

5-8 listova, u količini 0,5-0,75 kg/ha, i to :

- 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na srednje teškim tlima
- 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na teškim i humusom bogatim tlima

Zbog naglašene fitotoksičnosti za sunčanih i toplih dana tretiranje treba obaviti u poslijepodnevnim satima.

U rajčici

- 8-10 nakon presađivanja u količini 0,5-1,0 kg/ha (5-7,5 g na 100m²) Nije dozvoljena primjena na rajčici iz sjemena zbog fitotoksičnosti!

U lucerni

samo u zasnovanoj (etabliranoj) lucerni, u količini 0,75-1,2 kg/ha (7,5-12 g na 100m²) ovisno o tipu tla.

Primjenjuje se u vrijeme zimskog mirovanja.

U soji

Nakon sjetve a prije nicanja soje, u količini 0,5-1,0 kg/ha(5-10 g na 100 m²) Radi potpunijeg djelovanja na korove u sušnim područjima , sredstvo se može primjeniti u dva tretiranja i to:

- prvo tretiranje prije sjetve soje,uz inkorporaciju, u količini 0,25 kg/ha (2,5 g na 100m²)
- drugo tretiranje nakon sjetve a prije nicanja , u količini 0,25-0,5 kg/ha (2,5-5 g na 100 m²)

Manje količine primjenjuju se na srednje teškim tlima a veće na teškim, humusom bogatim tlima.

Učinak u rajčici



Djelovanje Jokera na širokolisne korove u soji

