

Kusabi®

1L e



Fungicid sa dugotrajnim preventivnim i kurativnim delovanjem na prouzrokovaoce pepelnice

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Aktivna materija: Piriofenon

Sadržaj: 300+/- 15 g/l

Obaveštenje o opasnosti:

- H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma.
- H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
- P270 Ne jesti, ne piti niti pušiti tokom rukovanja ovim preparatom.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitnu za lice.
- P308+P313 Ako dođe do izlaganja ili se sumnja da je došlo do izlaganja: potražiti medicinsku pomoć ili savet.
- P391 Skupiti prosuti sadržaj.
- P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže na za to određeno odgovarajuće mesto.

Pažnja!



- EUH401 Pridrživati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
- SP1 Sprečiti zagađenje voda sredstvom za zaštitu bilja ili njegovom ambalažom.
- SPo2 Posle primene sredstva, oprati zaštitnu odeću.
- U slučaju potrebe kontaktirati Nacionalni centar za kontrolu trovanja (VMA), Crnotravska 17, Beograd. Telefon: 011/ 266 11 22 i 011/ 360 84 40**



Distributer za Srbiju: **Belchim Crop Protection SRB doo**
Vladimira Popovića 6, Novi Beograd - tel: +381(0) 63 364 857

Pridrživati se uputstva za primenu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU

Klasifikacija rezistentnosti (FRAC):
U8

Broj šarže i datum proizvodnje:
Utisnuti su na ambalaži.

Rok upotrebe: 3 godine

Broj i datum rešenja o registraciji:
321-01-174/2016-11 od 08.12.2016 i
321-01-1296/2017-11 od 22.12.2017.
Izdato od strane Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Proizvođač:

ISK ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park,
De Kleetlaan 12B
B-1831 Diegem - Belgium
© Kusabi je registrovan zaštitni znak Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. Japan

Zastupnik: Vins 2000 d.o.o. Beograd

UPUTSTVO ZA PRIMENU:

PRIMENA: Kusabi je transaminarni fungicid. Deluje preventivno i kurativno tako što inhibira formiranje apresorija i prodiranje hifa u biljnu ćeliju, time sprečava formiranje micelija i dalju sporulaciju prouzrokovaoce bolesti.

kultura	Efikasno deluje na prouzrokovaoce bolesti	količina preparata l/ha	utrošak vode l/ha	vreme tretiranja prema fenofazi razvoja
Vinova loza	pepelnice (Uncinula necator)	0,2 - 0,3	600-1000	Preventivno tokom čitave vegetacije

Maksimalan broj tretiranja: tri puta u toku vegetacije.

Radna karenca (vreme u kome nije dozvoljen ulazak u polje posle tretiranja): do susenja depozita, 6-12 sati.

Karenca: 28 dan.

Priprema rastvora za prskanje: Izmerena količina proizvoda se sipa u rezervoar prskalice koji je predhodno do pola napunjen vodom. Nakon mešanja rezervoar se dopuni preostalim potrebnom količinom vode u skladu sa obimom upotrebe. Preparat za prskanje pripremiti neposredno pre upotrebe, i odmah koristiti. Koriste se standardni uređaji za tretiranje. Način primene folijarno, prskanjem ili orošavanjem. Tretiranje iz aviona nije dozvoljeno.

Mogućnost mešanja: mešanje sa drugim proizvodima samo uz proveru kompatibilnosti i preporuku proizvođača.

Mogućnost fitotoksičnosti: Uz primenu po uputstvu na odobrenim usevima, preparat nije fitotoksičan.

Mere zaštite životne sredine: Ne tretirati po jakoj vrućini, niti po jakom vetru. Prskanje ne sme uticati na susedne useve. Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda, tretirajući najmanje 20m od njih.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati zaključan u dobro zatvorenoj, originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, na suvom mestu, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti i vlage, u provetrenom prostoru, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, van domaćaja dece i životinja. Prodaja je dozvoljena samo u originalnom pakovanju proizvođača.

Postupak čišćenja uređaja za primenu: Posle prskanja, potrebno je temeljno oprati prskalicu i njene delove prema sledećem postupku:

- 1) Nakon završenog tretiranja isperite rezervoar čistom vodom u trajanju od 10 minuta.
- 2) Napunite rezervoar čistom vodom i dodajte sredstvo za čišćenje prema uputstvu za njegovu upotrebu. Ovim rastvorom isperite delove prskalice i napunjen rezervoar ostavite 10 minuta bez mešanja, a zatim ispraznite.
- 3) Ponovite isti postupak još jednom.
- 4) Delovi prskalice se moraju čistiti odvojeno.
- 5) Radi uklanjanja tragova sredstva za čišćenje ponovo temeljno isperite rezervoar i ostale delove prskalice čistom vodom.

Postupanje sa ostacima sredstva i ispražnjenom ambalažom Neiskorišćeni ostaci sredstva se ne smeju bacati u vodotokove, kanalizacionu mrežu, septičke jame, niti prolivati po zemlji ili odlagati na komunalne deponije ili na druga mesta koja nisu predviđena za odlaganje opasnog otpada.

Praznu ambalažu potrebno je isprati vodom odmah nakon pražnjenja, postupkom trostrukog ispiranja. Tečnost od ispiranja (iscadak) ambalaže sipa se u rezervoar prskalice i koristi za pripremanje sredstva za tretiranje. Ostaci sredstva i otpadna ambalaža predaju se ovlašćenom pravnom licu radi zbrinjavanja na propisan način. Sa neupotrebljenim ostacima sredstva postupka se u skladu sa propisima o upravljanju otpadom, a sa otpadnom ambalažom u skladu sa propisima o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristiti u druge svrhe

Mere zaštite na radu: Obavezno koristiti opremu za ličnu zaštitu. Za zaštitu oči, naočare koje dobro prijanjaju ili vizir. Za zaštitu kože ruku i drugih delova tela koristiti zaštitnu odeću, obuću i rukavice. Za vreme rada ne jesti, ne piti i ne pušiti. Nakon završetka rada, radno odelo kao i izložene delove tela treba oprati vodom i sapunom. Svu korišćenu zaštitnu opremu treba oprati, očistiti i odložiti.

Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći: sredstvo može da izazove neke opšte simptome i znake trovanja, kao što su: muka, gađenje, malaksalost, glavobolja, a nekada i povraćanje. Ovi otrovi mogu izazvati i iritaciju kože, oči i digestivnog trakta.

Terapija: Nega posmatranjem simptoma. Protivotrova nema.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je prevesti iz kontaminiranog područja na svež vazduh ili u dobro provetren prostor i zaštititi od hladnoće. **Dođir s očima:** Ukloniti kontaktna sočiva. Ispirati oči laganim mlazom čiste vode najmanje 15 minuta. **U slučaju gutanja:** Ako je unesrećena osoba pri svesti i spremna na saradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje. Unesrećenu osobu odvesti u najbližu zdravstvenu ustanovu. **Dođir s kožom:** Skinuti kontaminiranu odeću i obuću i dobro isprati zahvaćeno područje vodom i sapunom u trajanju od najmanje 15 minuta. **Udisanje isparenja:** Unesrećenu osobu izneti iz kontaminiranog područja na svež vazduh ili u dobro provetren prostor. U slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć lekara i obavezno pokazati etiketu proizvoda.

U slučaju tegoba zatražiti pomoć lekara i obavezno pokazati etiketu proizvoda. Ukoliko je potrebno pozvati Nacionalni centar za kontrolu trovanja, VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel: 011/36 08 440 ili 011/266 11 22.

Mere zaštite u slučaju ispuštanja sredstva u životnu sredinu:

Opšte mere: Pre ulaska u kontaminirani prostor obuci zaštitnu opremu (gumene cizme, zaštitno odelo, zaštitne rukavice). Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu, zatim oprati kožu vodom i sapunom. Ako dođe do izlivanja odmah obavestiti policiju ili sanitarnu inspekciju. Kontaminiranu površinu odmah prekriti apsorbernim materijalom zemljom ili peskom, time sprečiti da preparat dospe u vodotokove i okolnu vegetaciju, a potom sve pokupiti u bezbednu ambalažu i deponovati u za to određeno mesto.

Protivpožarne mere: U slučaju požara gasiti penom za gašenje, suvim prahom, peskom za gašenje ili zemljom. Voda se može koristiti samo u formi blage izmaglice, i ukoliko je savršeno osigurano da kontaminirana voda za gašenje neće dospeti u javnu kanalizaciju i izvore podzemnih voda i druge vodotokove.

Prodajna mesta: Poljoprivredne apoteke.

Upozorenje: Proizvođač garantuje kvalitet sredstva dok se ono prodaje u originalnoj ambalaži i zatvoreno. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu koja nastane usled rukovanja, korišćenja ili skladištenja na način koji nije naveden u ovom uputstvu.