

Fungicid za suzbijanje čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i plamenjače paradajza, krompira, luka i krastavca

Aktivna materija: bakar, iz bakar(I)oksida (Cu_2O) 750 g/kg

Formulacija: vodotopive granule (WG), crvenkaste boje

Primena:

- u zasadu **jabuke** za suzbijanje čađave pegavosti lista i krastavosti plodova u koncentraciji **0,2%** (20g u 10 lit vode) u toku mirovanja vegetacije, i **0,1%** (10g u 10 lit vode) u vegetaciji do faze „mišije uši“
- u usevu **paradajza, krompira, luka i krastavca** za suzbijanje plamenjače u količini **1,5 – 2 kg/ha** (15 – 20 g na 100m²), pre ostvarivanja uslova za zarazu ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma

Osobine i način primene:

- Preparat se posle sušenja rastvora čvrsto vezuje za površinu biljke odnosno lista i jako se teško ispira kišom, što obezbeđuje duže zaštitno delovanje od ostalih bakarnih preparata
- Najsavremniji fungicid na bazi bakra u obliku vodotopivih granula koji ne stvara prašinu i veoma se lako rastvara u vodi pri pripremi rastvora
- Bakarni fungicid crvene boje koja potiče od visoke koncentracije bakar-oksida koji je najaktivnije jedinjenje bakra
- Primenuje se u znatno manjim količinama od ostalih bakarnih fungicida
- Ovaj preparat ima izuzetnu čistoću aktivne materije i dozvoljen je i u organskoj proizvodnji
- Odlikuje ga visoka selektivnost i produženo rezidualno delovanje

Karenca:

Paradajz i krompir 14 dana, luk 21 dan, jabuka OVP

Pakovanje: 1 kg, 250 g



