



Insekticid i akaricid na bazi parafinskog ulja za suzbijanje širokog spektra štetočina.

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Aktivna materija : **parafinsko ulje** (CAS broj: 8042-47-5)

Sadržaj: 817 g/l

Broj i datum rešenja o registraciji: 321-01-1390/2016-11 od 17.02.2017.

Izdato od strane Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede i životne sredine Republike Srbije.

Broj šarže i datum proizvodnje: Utisnuti su na ambalaži.

Rok upotrebe: 4 godine.

Obaveštenje o opasnosti:

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
H412 Štetno za vodenu sredinu sa dugotrajnim posledicama.

P273 Izbegavati izlivanje u životnu sredinu.

P301+P310 Ako se proguta odmah pozvati centar za kontrolu trovanja.

P331 Ne izazivati povraćanje.

P405 Skladištitи под klučem.

P391 Sakupiti proliveno.

P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže na za to određeno odgovarajuće mesto.

EUH401 Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po Zdravljie ljudi i životnu sredinu.

SP1 Sprečiti zagadjenje voda sredstvom za zaštitu bilja ili njegovom ambalažom (Uredaje za primenu sredstva za zaštitu bilja ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprečiti zagadjenje odvodnih kanala sa poljoprivrednih površina i puteva).

Spe3 Zbog zaštite vodenih organizama i neseljanog bilja, treba poštovati zone sigurnosti od 20m od nepoljoprivredne/vodene površine. Pridržavati se uputstva za primenu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU.

Pakovanje:

1L e



Proizvođač:
Belchim Crop Protection NV/SA
Technologielaan 7,
B-1840 Londerzeel,
Belgium
+32 (0)52 30 09 06;
fax:+32 (0)52 30 11 35



5 414572 310750 >

UPUTSTVO ZA PRIMENU: OVITEX je kontaktni insekticid i akaricid. Koristi se za zaštitu zasada voća od širokog spektra štetočina. Deluje na sve stadijume razvoja kod insekata i grinja.

Količina primene prema priloženoj tabeli:

Usev u kome se primenjuje	JABUKA	KRUŠKA
Štetni organizmi koje sužbija	Štitaste vaši (<i>Quadrastrius perniciosus</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , <i>Sphaerolecanium prunastri</i> , <i>Parlatoria oleae</i> , <i>Lepidosaphes ulmi</i>). Grinje (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i> , <i>Bryobia rubrioculus</i>). Jabukina krvava vaš (<i>Erysoma lanigerum</i>). Jabukina zelena vaš (<i>Apnis pomii</i>). Brasnasta jabukina i brašnasta kruškina vaš (<i>Dysaphis piri</i> , <i>D.plantaginea</i>). Savijač pupoljka (<i>Archips rosanaus</i>)	Kruškina buva (<i>Psilla pyri</i> , <i>Cacopsilla pyri</i>)
Količina primene	20 l/ha	- jednokratna primena: 20 l/ha - dvokratna primena: 2x10 l/ha (u razmaku od, najmanje, 2 dana.)
Vreme primene	Do početka cvetanja (fenofaza razvoja BBCH skale: 53-57), kada se pojave zimske jaja. Za suzbijanje kruškine buve: do početka cvetanja, na početku piljenja larvi.	
Utrošak vode	1.000 – 1.500 l/ha (10-15 l na 100 m ²)	
Maksimalan broj tretiranja	Jednom u toku godine na istoj površini	Jednom jednokratno ili dva puta dvokratno

Karenca: obezbedena vremenom i načinom primene.

Mogućnost mešanja: može se mešati sa drugim preparatima uz preporuku proizvođača.

Mogućnost fitotoksičnosti: Nije fitotoksican na odobrenim usevima i u preporučenoj dozi primene.

Mere zaštite životne sredine: Ne tretirati po jakoj vrućini (preko 32 °C), niti po jakom vetru. Prskanje ne sme uticati na susedne useve. Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i specifične kontaminacione vode, tretirajući najmanje 20m od rijih.

Preiprema rastvora za prskanje: Izmerena količina proizvoda se sipa u rezervoar prskalice koji je predhodno do pola popunjen vodom. Nakon mešanja rezervoar se dopuni preostalom potrebnom količinom vode u skladu sa obimom upotrebe. Preparat za prskanje pripremiti neposredno pre upotrebe, i odmah koristiti. Koriste se standardni uređaji za tetiranje. Tretiranje iz aviona nije dozvoljeno.

Postupanje sa ostacima sredstva i ispräžnjenom ambalažom: Neiskorišćeni ostaci sredstva se ne smiju bacati u vodotokove, kanalizacionu mrežu, septične jame, niti prolivati po zemlji ili odlagati na komunalne deponije ili na druge mesta koja nisu predviđena za odlaganje opasnog otpada.

Praznu ambalažu potrebno je isprati vodom odmah nakon praznjenja. Tečnost od ispiranja (isicedak) od ambalaže sipa se u rezervoar prskalice za primenu sredstva za zaštitu bilja i koristi za pripremanje sredstva za tretiranje. Ostaci sredstva i otpadna ambalaža predaju se ovlašćenom pravnom licu radi zbrinjavanja na propisan način.

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristiti u druge svrhe.

Postupak čišćenja uređaja za primenu: Posle prskanja, potrebno je temeljno oprati prskalicu i njene delove prema sledećem postupku:

- Nakon završenog tretiranja isperite rezervoar čistom vodom u trajanju od 10 minuta.

2) Napunite rezervoar čistom vodom i dodajte sredstvo za čišćenje prema uputstvu za njegovo upotrebu. Ovim rastvrom isperite delove prskalice i napunjen rezervoar ostavite 10 minuta bez mešanja, a zatim ispraznite.

- Ponovite isti postupak još jednom.
- Delovi prskalice se moraju čistiti odvojeno.

5) Radi uklanjanja tragova sredstva za čišćenje ponovo temeljno isperite rezervoar i ostale delove prskalice čistom vodom

Mere zaštite na radu: Obavezno je koristiti opremu za ličnu zaštitu. Za zaštitu očiju koristiti naočare koju dobro prijavljuju i vizir. Za zaštitu kože ruku i uboču i dobro isprati zaštitnu odeću, obuću, rukavice. Za vreme rada ne jesti, ne piti i ne pušiti. Nakon završetka rada, ruke i druge izložene delove tela treba oprati vodom i sapunom. Svu korišćenu zaštitnu opremu i odeću oprati, očistiti i odložiti.

Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći: sredstvo može da izazove neke opšte simptome i znake trovanja, kao što su: muka, gajdene, malakslost, glavobolja, a nekada i povraćanje. Ovi otrovi mogu izazvati i initaciju kože, očiju i digestivnog trakta.

Terapija: Negativno posmatranjem simptoma. Protivotrovanje nema. U slučaju potrebe detaljnija uputstva se mogu dobiti pozivom Centra za kontrolu trovanja, VMA, Crnotravska 17, Beograd, telefon: 011/36 08 440.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebitno je prenesti iz kontaminiranog područja na svež vazduh ili u dobro provetren prostor. U slučaju potrebe, zatražiti medicinski savet i pokazati etiketu. **Dodir s očima:** Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko ih imate i ispirati oči laganim mlazom čiste vode najmanje 15 minuta. U slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć lekara i obavezno pokazati etiketu proizvoda.

Uslučaj u qutanju: Ako je unesrećena osoba pri svetski i spremna na saradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje. Unesrećenu osobu odvesti u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Dodir s kožom: Skinuti kontaminiranu odeću i obuću i dobro isprati zaštiteno područje vodom i sapunom u trajanju od najmanje 15 minuta. U slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć lekara i obavezno pokazati etiketu proizvoda.

Uslučaj isparjenja: Unesrećenu osobu izneti iz kontaminiranog područja na svež vazduh ili u dobro provetren prostor. U slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć lekara i obavezno pokazati etiketu proizvoda.

Mere zaštite u slučaju ispuštanja sredstva u životnu sredinu: Opšte mere: Pre ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odelo, zaštitne rukavice). Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu, zatim oprati kožu vodom i sapunom. Ako doveđe do izlivanja odmah obavestiti policiju ili sanitarnu inspekciju. Kontaminiranu površinu odmah prekriti absorbenim materijalom zemljom ili peskom, time spreći da preparat dosepi u vodotokove i okolnu vegetaciju, a potom sve pokupiti u bezbednu ambalažu i deponovati za to određeno mesto. Protivpozarne mere: U slučaju požara gasiti penom za gašenje, suvim prahom, peskom za gašenje ili zemljom. Voda se može koristiti samo u formi blage izmaglice, i ukoliko je savršeno osigurano da kontaminirana voda za gašenje neće dospeti u javnu kanalizaciju i izvore podzemnih voda i druge vodotokove.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati zaključano u dobro zatvorenog, originalnom ambalažu, s originalnom etiketom, na suvom mestu, zaštićeno od direktnog sunčeve svetlosti i vlage, u provetrenom prostoru, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, van domaćaja deži i životinja. Prodaja dozvoljena sama u originalnom pakovanju proizvođača.

Prodajna mesta: Poljoprivredne apoteke.

Upozorenje: Proizvođač garantuje kvalitet sredstva dok se ono prodaje u originalnoj ambalaži i zatvoren. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu koja nastane usled rukovanja, korišćenja ili skladištenja na način koji nije naveden u ovom uputstvu.

BELCHIM
CROP PROTECTION

Zastupnik za Srbiju: **BELCHIM CROP PROTECTION SRB DOO**
Vladimira Popovića 6, 11070 Novi Beograd. Tel. +38163364857