



PALACID 480-SL

Pinus TKI

herbicid

Aktivna materija: 480 g/l dikamba (u obliku DMA soli)

Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Pakovanje: 500 ml, 1 l, 5 l

Način delovanja: selektivni, hormonalni i translokacioni herbicid.

Registrovano u programu zaštite: kukuruz

DELOVANJE NA KOROVE:

Dobro suzbija (Ef. Preko 90 %):

Jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su: ambrosija pelenasta (*Ambrosia artemisifolia*), štir bljutavi (*Amaranthus blitoides*), štir obični (*A. retroflexus*), vijušac njivski (*Bilderdykia convolvulus*), pepeljuge (*Chenopodium spp.*), konica obična (*Galinsoga parviflora*), tušt obični (*Portulaca oleracea*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), dvornik obični (*P. persicaria*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), gorčike (*Sonchus spp.*), čistac jednogodišnji (*Stachys annua*), boca obična (*Xanthium strumarium*);

Višegodišnji širokolisni korovi, kao što su gorčike (*Sonchus spp.*)

Zadovoljavajuće suzbija (Ef. 75-90%):

Jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su: lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), tatula obična (*Datura stramonium*), mlečike (*Euphorbia spp.*), dvornik ptičiji (*Polygonum aviculare*), *P. amphibium*;

Višegodišnji širokolisni korovi, kao što su: palamida njivska (*Cirsium arvense*), poponac njivski (*Convolvulus arvensis*), mlečike (*Euphorbia spp.*)

Primena:

PALACID 480-SL se koristi u usevima **silaznog i merkantilnog kukuruza** (bez poduseva) uništava jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u količini:

0,5-0,7 l/ha (5-7 ml na 100 m²), tretiranjem kada je kukuruz u fazi 5 listova (faza 15 BBCH-skale), a korovi 2-6 listova.

UTROŠAK VODE: 200-400 L/ha (2-4 l na 100 m²).

Karenca (u danima):

OVP- silazni i merkantilni kukuruz.