

PUSH 5

молускоцид

гранулирани мамак тиркизно плаве боје – GB

САСТАВ ПРЕПАРАТА (активна супстанца):

Генерички назив:	metaldehid
Хемијски назив (IUPAC):	2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklo-oktan
	Садржај: 5% ± 0,5 %
	Техничка чистота: min 98,5%
	CAS br. 108-62-3
Носач:	пшенично брашно

Пре примене средства за заштиту биља обавезно прочитати етикету

ПРИМЕНА

PUSH 5 је молусцид са контактним и дигестивним деловањем и користи се у **вртовима, расадницима и повртњацима за сузбијање**: великог пужа голаћа (*Arion lusitanicus*), малог црног пужа голаћа (*Deroceras agreste*) и малог сивог пужа голаћа (*Deroceras agreste*) посипањем у траке, дуж редова и у гомилице око биљке (не на листове), у количини од 100 g/100m². Препарат се примењује после заливања усева. Најмање 4 дана након примене препарата не би требало заливати усев.

PUSH 5 се примењује током вегетације, по појави штетника, најбоље у јутарњим или вечерњим сатима када пужеви излазе из склоништа.

Максимални број третмана у току године на истој површини: два пута у току године са интервалом између третирања од 14 дана.

НАЧИН ПРИМЕНЕ: Грануле се постављају кашичицом или неким другим погодним предметом (метална или пластична чашица).

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ

PUSH 5 се не меша са водом и примењује се директно на земљиште.

КОМПАТИБИЛНОСТ

Није применљиво за ову врсту формулације, намену и начин примене.

ЗАНОШЕЊЕ

Спречити доспевање препарата изван жељене површине и на водотокове и друге водене површине. Не загађивати водене површине или канализацију препаратом нити употребљеном амбалажом.

РЕЗИСТЕНТНОСТ

С обзиром на механизам деловања, није утврђена појава резистентности. Класификација резистентности (IRAC): -

ФИТОТОКСИЧНОСТ

Уколико је примењен према препорукама датим у овом упутству за употребу и у препорученим количинама, производ није фитотоксичан.

КАРЕНЦА (време између последње примене препарата и бербе, односно жетве): За салату, кромпир и поврће 21 дан.

ТОЛЕРАНЦА – МДК (максимално дозвољена количина остатака пестицида): 0,3 mg/kg за воће, поврће, јагоде и грожђе.

НАПОМЕНА: На третираним површинама најмање 7 дана након третирања не дозволити приступ домаћим животињама.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ:

Обавештење о мерама предострожности:	P102 P262 P270	Чувати ван домаћаја деце. Не дозволити контакт са очима, кожом или одећом. Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом.
Додатна обавештење о опасности:	P 280 EUN401	Носити заштитне рукавице. Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.
Опште додатне ознаке безбедности:	SP1	Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом.
Посебне додатне ознаке безбедности за заштиту животне средине:	SPe 6	Због заштите птица/дивљих врста сисара расуто средство за заштиту биља треба уклонити.

Негативно деловање средства за заштиту биља на воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозащитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, језера, изворишта вода и бунара), третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СЗБ У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Уколико је дошло до неконтролисаног испуштања великих количина препарата неопходно је уз примену одговарајуће заштитне опреме купити препарат и сместити га у затворене контејнере. Препарат који је присут ван места употребе треба купити и као такав складиштити у судове, док се не обезбеди дефинитивно одлагање тог одпада у складу са прописима.

ЗАШТИТА НА РАДУ: При раду са препаратом се треба придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите. При раду пазити да средство не доспе у очи. Током рада не јести, пити ни пушити. Обавешно је ношење заштитних рукавица.

СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ

Симптоми и знаци тровања укључују мучнину, грчеве у трбуху, повраћање, црвенило коже лица, атаксију, хиперрефлексију, а при масивним ингестијама је могућа и појава конвулзија метаболичке ацидозе, коме, престанка дисања и смрти.

У случају да средство доспе у организам:

- перорално (гутањем) – испрати уста, попити неколико чаша воде а затим консултовати лекара.
- перкутано (додир са кожом), уклонити контаминирану одећу и опрати контаминирани делове тела сапуном и већом количином воде. Консултовати лекара ако је потребно.
- у случају додира са очима испрати одмах са већом количином воде. Консултовати лекара ако је потребно.

Лечење подразумева рехидратацију са надокнадом електролита и антихистаминике по потреби. Упозорење: забрањено је конзумирање алкохолних пића. Препоручује се дијета без масти.

У случају сумње на тровање обратити се лекару. Лекар по потреби консултује:

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

Национални центар за контролу тровања

Црнотравска 17, Београд

Дежурни телефон: (24 часа дневно): 011 360 84 40

СКЛАДИШТЕЊЕ

Чувати под кључем, ван домаћаја деце, у добро затвореним, оригиналним посудама, на сувом месту са добром вентилацијом, изван места становања, одвојено од хране, пића и сточне хране и не на директној сунчевој светлости. У случају просипања, просути препарат сакупити и одложити све остатке на посебна места предвиђена за неискоришћене отрове и амбалажу.

Препарат није запаљив. Одговарајућа средства за гашење пожара: вода, пена, суви прах и угљен-диоксид. Избежавати коришћење јаког воденог млаза (ризик контаминације). Упозорење: у случају пожара користити заштитну маску.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАТКОМ СРЕДСТВА И ПРАЗНОМ АМБАЛАЖОМ:

Испражњену амбалажу од средства за заштиту биља потребно је снажно протрести да би што мањи садржај средства за заштиту биља заостао у амбалажи. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже СЗБ или коришћење испражњене амбалаже у друге сврхе!**

Празну амбалажу и преостале количине препарата треба на погодан начин сакупити и одложити у за то одређене контејнере односно на за то одређено и на адекватан начин обезбеђено место. Са неутрошеним количинама препарата поступити у складу са Законом о управљању отпадом.

НАПОМЕНА КОРИСНИКУ

Препарат се мора користити само према препорукама из овог упутства за употребу. Произвођач неће бити одговоран за губитке или штете изазване неправилном употребом овог производа. Корисник преузима сав ризик у случају непрепоручене примене.

Дозвола за стављање у промет: Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије број: 321-01-2223/2013-11 од 25.03.2015. године. године и Измена решења Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 321-01-2587/2013-11 од дана 24.09.2015.

Произвођач: Sharda Cropchem.Ltd, Domnic Holm, 29th Road, Bandra(w), Mumbai – 400 050, India.

Заступник: ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 11000 Београд.

Величина паковања у промету: 25, 30; 50; 100; 250; 300; 500 грама, 1; 5; 10 и 25 килограма.

Рок трајања: 3 године. **Датум производње и бр. шарже** утиснут на паковању.