

# Ranman® TOP

## ФУНГИЦИД за сузбијање пламенњаче у кромпиру и парадајзу

### SC - Концентрована суспензија

#### АКТИВНА МАТЕРИЈА:

Генерички назив: Ciazofamid

Садржај:  $160 \pm 9,6$  g/l

**ХЕМИЈСКИ НАЗИВ:** IUPAC-YU:(4-chloro-2-ciano-N,N-dimetil-5-p-tolylimidazole-1-sulfonamide)

**C.A:** (4-chloro-2-ciano-N,N-dimetil-5-(4-metilfenil)-1H-imidazol-1-sulfonamid)



Центар за контролу тројања Војно медицинска академија (ВМА), Црнотравска 17, 11000 Београд,  
тел: 011/2661122 и 011/360 84 40



Увозник: Belchim Crop Protection Srb d.o.o.

Владимира Поповића 6, Нови Београд, Република Србија - Тел: (+381) 63 364 857

## Садржај: 1L e

ДРУГИ НАЗИВ: IKF 916 160SC  
CAS бр.: 120116-88-3

ДОЗВОЛА ЗА ПРОМЕТ: Решење о издавању стапне дозволе бр. 321-01-1416/2010-11 од 28.03.2011. и измена решења бр. 321-01-122/2015-11 од 26.02.2015. Издана од стране Управе за заштиту биља, Министарства пољoprivrede и заштите животне средине, Републике Србије. Омладинских brigada 1, Београд.

Рок употребе: 5 година, уз правилно усклађиштење у оригинално затвореној и неоштећеној амбалажи.

ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА  
ЗАШТИТУ БИЉА, ОБАВЕЗНО  
ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ!

Заступник: Vins 2000 d.o.o.  
Установчика 64/xv  
11000 Београд - Република Србија

Произвођач:

ISK BioSciences Europe N.V.  
Pegasus Park, De Kleetaan 12B  
B-1831 Diegem, Belgium  
+32 (0) 2 627 86 11

© Ranman Top је регистровани заштитни знак  
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd; Japan



- H319 Доводи до јаке иритације ока.  
H411 Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама  
P102 Чувати ван домашаја деце.  
P270 Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом.  
P273 Избегавати испуштање/ослобађање у животну средину.  
P280 Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштитне наочаре/заштиту за лице.  
P305+P351+P338 АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Пажљиво исприрати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.  
P337+P313 Ако иритација ока не пропади: Потражити медицински савет/мишљење.  
P391 Сакупити прости садржај.  
P501 Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалном / регионалном / националном / међународном регулативом.  
EUH210 Безбедносни лист доступан на захтев.  
EUH401 Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.  
SP1 Спремчи загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода.



ПРИМЕНА СРЕДСТВА: RANMAN TOP фунгицид са протективним контактним деловањем за сузбијање пламенњаче у кромпиру и парадајзу (*Phytophthora infestans*) у количини од 0,5l/ha (5ml на 100m<sup>2</sup>).

МАКСИМАЛАН БРОЈ ТРЕТИРАЊА: Средство се сме користити највише 3 пута годишње на истој површини током вегетације.

НИЧИН ПРИМЕНЕ И УТРОШАК ВОДЕ: прскање уз утрошак воде од 200 до 400 l / ha (2-4 l на 100m<sup>2</sup>).

ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ: током вегетације (фаза BBCH 19-71) превентивно, пре стицања услова за заражавање.

ТРЕТИРАЊЕ ИЗ ВАЗДУХОПЛОВА: није допуштено.

КАРЕНЦА: 3 дана за парадајз; 7 дана за кромпир

НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ПРЕПАРАТА:

- На водене организме (отровност): веома отрован за водене организме. Спремчи досевање препарата у воде (водотоци, језера, бунари, изворишта вода) и канализациону мрежу.
- На воде (контаминација): приликом третирања треба поштовати водозаштите зоне и спречити контаминацију вода (водотоци, језера, изворишта вода бунара) третирајући најмање 20m удаљено од њих.

ТОЛЕРАНЦА-МДК (максимално дозвољена количина пестицида): У складу са прописом којим се прописују максимално дозвољене количине остатака у храни и храни за животиље и о храни и храни за животиље за које се утврђују максимално дозвољене количине остатака.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ: Користити заштитну одећу и обућу при раду, придржавати се личне хигијене за и након рада са средством. Држати даље од животних намирница и пива.

ПОСЕБНЕ ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ: Носити заштитну опрему. За време рада не сме се јести, пити нити пушити. По завршетку рада скинuti радну одећу и рукавице и добро се опрати водом и сапуном.

СИМПТОМИ, ЗНАЦИ ТРОВАЊА И ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ: Симптоми и знаци тројања: Нису описана тројања код људи.

На основу података о токсичности на експерименталним животињама и скромним података о акутним тројањима код људи, зна се да могу да изазову неке опште симптоме и значе тројања као што су мука, гађање, малаксалост, главобоља а некад и повраћање. Ови отрови изазивају и црвенило и сврб коже и иритацију слузница очију и дигестивног тракта, што се манифестију црвенилом конјуктива, и сузњем, хиперсаливацијом, гребањем у гуши и болом у трубах.

Права помоћ и лечење:

Ако доспе у очи: Сместа опрати са доста воде или раствором за испирање очију, повремено отварати капке све до потпуног уклањања хемикалије. Ако се иритација настави потражити лекарску помоћ.

Ако доспе на кожу: Опрати кожу са доста воде и сапуном. Ако се јави иритација потражити помоћ лекара.

Ако се прогута: Испрати уста и попити неколико чаша воде или млека. Не изазивати повраћање. Ако до повраћања дође, испрати уста и поново дати течност. Уколико је особа у несвести не давати ништа преко уста. Сместа потражити лекарску помоћ.

У случају потребе консултовати Центар за контролу тројања Војно медицинска академија (ВМА), Црнотравска 17, Београд, тел. 011/2661122 и 011/360 84 40.

НАЧИН ЗБРЂАВАЊА (УНИШТАВАЊА) И ПОСТУПАК СА ПРЕОСТАЛИМ НЕУТРОШЕНИМ И НЕИСПРАВНИМ КОЛИЧИНAMA СРЕДСТВА И АМБАЛАЖОМ: Никада не користити празну амбалажу у друге сврхе. Остатке средстава за заштиту биља испразнити из амбалаже у резервоар прскалице. У празну амбалажу додати воду до 1/4 запремине, затим добро испрати амбалажу. Након тога излити воду у резервоар прскалице, а амбалажу оставити да се суши 30 секунди (поступак поновити 3 пута). Тако испрану амбалажу треба одложити на прописани начин. Неутрошене количине средстава треба сачувати за наредна третирања у добро затвореној, оригиналној амбалажи уз прописано усклађиштење. Ако се неутрошене количине неће користити за наредна третирања, потребно их је збринuti у складу са прописима о поступању са опасним отпадом.

Pripremio: Igor Jeremijev	Maketa: samolepljive etikete	Boja za štampu:
Datum: 13.12.2018.	Šifra:	1. Cyan
Verzija: 2.0	Standard:	2. Magenta
Izmena: 01	Dimenzija: 146x270mm	3. Yellow
		4. Black
		5. Pantone 287 C
		6.
		7.
		8. Lak