

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu
PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ŽAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU



Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje travnih i širokolistnih korova u uljanoj repici.

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Aktivna materija: metazahlor, sadržaj: 333 g/l i Kvinmerak, sadržaj: 83 g/l.

Broj i datum rešenja o registraciji: 321-01-732/2018-11 od 29.08.2018. izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H351 Sumnja se da može da dovede do pojava karcinoma.

H410 Veoma toksično po život svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

P210 Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe.

P261 Izbegavati udisanje prašine/dima/gasa/magle/para/spreja.

P280 Nosići zaštitne rukavice / zaštitu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice.

P308+P313 U SLUČAJU izlaganja ili zabrinutosti: Potražiti medicinski savet / mišljenje.

P333+P313 Ako dođe do iritacije kože ili ošipa: Potražiti medicinski savet / mišljenje.

P362+P364 Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.

P391 Sakupiti prosuti sadržaj.

P501 Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na propisano mesto.

SP1 Sprečiti zagadjenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom.

Uređaje za primenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda.

Sprečiti zagadjenje odvodnih kanala s poljoprivrednih površina i puteva.

SPe1 Radi zaštite podzemnih voda nemojte koristiti ovaj proizvod niti bilo koji drugi koji sadrži metazahlor u količini većoj od 1 kg metazahlora po ha u periodu od 3 godine na istoj površini.

SPe3 Radi zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 10 metara do vodene površine.

EUH 401 Pridržavati se uputstva za upotrebu radi izbegavanja rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

5 L
Broj šarže i datum proizvodnje:
Utisnuti su na ambalaži.
Rok upotrebe: 3 godine



PAŽNJA



RAPSAN PLUS®

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Rapsan Plus je herbicid koji se koristi posle setve, a pre nicanja, ili posle nicanja ozime i jare uljane repice.

Doza primene 2-2,5 l/ha, uz utrošak 200-400 l vode.

Vreme primene: za ozimu repicu (pre-emergence) posle setve, a pre nicanja (00-18 BBCH skale) ili (post-emergence) posle nicanja do faze tri prva lista (09-13 BBCH skale). **Za jaru repicu** (pre-emergence) posle setve, a pre nicanja (00-18 BBCH skale) ili (post-emergence) posle nicanja od faze dva prva lista do faze tri lista (12-13 BBCH skale).

Maksimalan broj tretiranja je jednom u tri godine.

Spektar korova na koje deluje: jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi: tarčužak (*Capsella bursa-pastoris*), pepeljuga (*Chenopodium album*), bročika lepuša (*Galiu aparine*), Geranium sp., dimnjaka (*Funaria officinalis*), Lamium sp., gorčika rapava (*Sonchus asper*), mlečika rana (*Euphorbia helioscopia*), čapljan obična (*Erodium cicutarium*), Galeopsis sp., mrtva koprija (*Lonium purpureum*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), gorčika obična (*Sonchus oleraceus*), mišjakinjabobična (*Stellaria media*), stisnuša kraljiva (*Thlaspi arvense*), čestoslavica poljska (*Veronica arvensis*), proso (*Echinochloa crus-galli*), jednogodišnja livađarka (*Poa annua*).

Najbolji rezultati se mogu ostvariti ukoliko se preparat primeni na dovoljno vlažnom zemljištu, kada je korov u fazi aktivnog porasta, a da usev nije prerastao korov. U trenutku upotrebe, listovi moraju biti suvi. Nemojte koristiti ovaj preparat ukoliko se prognozira kiša u narednih 4 sata. Nakon upotrebe preparata ne savetujte se kultivaciju ili bilo koja vrst obrade zemlje. **Karenca:** omogućena vremenom primene.

Priprema rastvora za prskanje: Izmerena količina preparata se sipa u uredaj za prskanje, napunjeno do polovine vodom. Nakon mešanja, rezervoar se dopuni preostalom potrebnom količinom vode, mešati tokom primene. **Tretiranje iz aviona nije dozvoljeno.**

Mogućnost mešanja: Moguće mešanje sa velikim brojem drugih aktivnih materija uz prveru kompatibilnosti i preporuku proizvođača.

Fitotoksičnost: Ukolikо se primenjuje po datom uputstvu, nema neželjene fitotoksičnosti.

Mere zaštite životne sredine: Sprečiti zagadenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uredaje za primenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprečiti zagadenje odvodnih kanala s poljoprivrednih površina i puteva. Zbog zaštite vodenih organizama treba poštovati zone sigurnosti od 5 metara do vodene površine.

Skladištenje i čuvanje potrebno je čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, sa originalnim etiketom, zaštićeno od direktnе sunčeve svetlosti i vlage, u proventrenom prostoru, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, van domaća dece i životinja.

Postupak čišćenja uredaja za primenu: Posle tretiranja, potrebno je temeljno oprati uredaj za primenu i njene delove prema sledećem postupku: isperite čistom vodom u trajanju od 10 minuta, potom dodajte sredstvo za čišćenje prema uputstvu za njegovu upotrebu. Ovim rastvrom isperite delove uredaja.

Ponovite isti postupak još jednom, delovi prskalice se moraju čistiti odvojen, potom sve ponovo temeljno isperite čistom vodom.

Postupanje sa ostacima sredstva i ispraznjrenom ambalažom

Neiskorišćeni ostaci sredstva ne smiju se bacati u jezera, vodotokove, kanalizacione mreže, septičke jame, prolivati po zemlji ili odlagati na komunalne deponije ili na druga mesta koja nisu predviđena za odлагањe opasnog otpada. Ostaci sredstva i ambalaža predaju se ovlašćenom pravnom licu, radi zbrinjavanja na propisan način. Sa neupotrebljenim ostacima sredstva postupa se u skladu sa propisima o upravljanju otpadom, a sa otpadnom ambalažom u skladu sa propisima o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili u ambalažu koristiti u druge svrhe!

Mere zaštite na radu: Obavezno koristiti opremu za ličnu zaštitu. Za zaštitu očiju koristiti naočare koje dobro prijedaju ili vizir. Za zaštitu kože ruku i drugih delova tela koristiti zaštitnu odeću, obuću, rukavice. Za vreme rada ne jesti, ne piti i ne pušti. Nakon završetka rada treba svuci radno odelo i izložene delove tela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili odložiti svu korišćenu zaštitnu opremu.

Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći: sredstvo može da izazove neke opšte simptome i znake trovanja, kao što su: muka, gadjenje, malakslost, glavobolja a nekada i povraćanje. Prva pomoć nakon udiranja: Unesrećenu osobu potrebno je prenesti iz kontaminiranog područja na svež vazduh ili u dobro proventren prostor i zaštiti od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije.U slučaju **dodira s očima:** Ukloniti kontaktne sočiva ukoliko ih nosite i ispirati oči laganim mlazom čiste vode najmanje 15 minuta. Nakon **gutanja:** Ako je unesrećena osoba pri svesti i spremna na sadržaj, treba joj isprati ute vodom. Ne izazivati povraćanje. **Dodirs kožom:** Skinuti kontaminiranu odeću i obuću i dobro isprati zahvaćeno područje vodom i sapunom u trajanju od najmanje 15 minuta. U slučaju da simptomi potaju tražiti lekarsku pomoć, obavezno pokazati etiketu. Detaljnija uputstva se mogu dobiti od Nacionalnog centra za kontrolu trovanja, VMA, Crnotravska 17, Beograd, telefon dežurnog toksikologa (0-24h)+381 11 36 08 440.

Mere zaštite u slučaju nezgode: Pre ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gurnjene čizme, zaštitno odelo, zaštitne rukavice). Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu i oprati kožu vodom i sapunom. Ako dode do izlivanja odmah obavestiti policiju ili sanitarnu inspekciju. Kontaminiranu površinu odmah prekriti absorbenim materijalom zemljom ili peskom, time sprečiti da preparat dospe u vodotokove i okolnu vegetaciju, a potom sve pokupiti u bezbednu ambalažu i deponovati u za to određeno mesto. **Protivpožарне mere:** Preparat je zapaljiva tečnost III. klase opasnosti. U slučaju požara gasiti penom za gašenje, suvim prahom, peskom za gašenje ili zemljom. Voda se može koristiti samo u formi blage izmaglice, i ukoliko je savršeno osigurano da kontaminirana voda za gašenje neće dospeti u javnu kanalizaciju i izvore podzemnih voda i druge vodotokove.

Prodajna mesta: Poljoprivredne apoteke

Upozorenje: Proizvođač garantuje kvalitet sredstva dok se ono prodaje u originalnoj ambalaži i zatvoreno. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu koja nastane usled rukovanja, korišćenja ili skladištenja na način koji nije naveden u ovom uputstvu.