

Kontaktni i lokalno sitemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem

Aktivna materija: cimoksanil 40 g/kg
mankozeb 400 g/kg

Formulacija: kvašljivi prašak (WP)

Osobine i način delovanja:

- Viloksan je kontaktni i lokalno sitemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem
- Kombinacija dve aktivne materije sa različitim načinom delovanja
- Cimoksanil je fungicid preventivnog, kurativnog i anti-sporulacionog delovanja sa brzim prodiranjem u list gde eliminiše patogene u toku prve polovine inkubacionog perioda. Mankozeb stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava pojavu infekcije preventivnim kontaktnim delovanjem sa produženim efektom

Primena:

Preparat **VILOKSAN** koristi se u:

- zasadu **vinove loze** za suzbijanje prouzrokovala **plamenjače** (*Plasmopara viticola*), u koncentraciji **0,3 %** (30 g u 10 litara vode).
- usevu **krompira** za suzbijanje prouzrokovala **plamenjače** (*Phytophthora infestans*), u količini od **2,5-3 kg/ha** (25-30 g/100 m²).

Količina vode:

200-400 l/ha u krompiru, 1000 l/ha u vinovoj lozi.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

- **Viloksan** primeniti preventivno ili u ranim stadijuma infekcije (obično jedan dan posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
- U zavisnosti od infekcionog potencijala, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima od 8-10 dana
- U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje obolenja, razmak između tretmana treba skratiti.





- **Viloksan** brzo prodire u biljno tkivo i usvaja se u roku od dva sata nakon primene.
- Ukoliko dođe do padavina u roku od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena, te se preporučuje ponavljanje tretmana.

Kompatibilnost:

Viloksan se ne sme mešati sa proizvodima alkalne reakcije (bordovska čorba), insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.

Preparat se na istoj površini može upotrebiti 2 puta u toku godine.

Karenca:

Krompir – 14 dana;
stone sorte vinove loze – 21 dan;
vinske sorte vinove loze – 42 dana

Pakovanje: 1kg; 250g; 30g



Agrimatco