

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolistnih korova u krompiru, paradajzu i soji

Aktivna materija: metribuzin 700 g/kg

Formulacija: vododisperzibilne granule (**WG**)

Osobine i način delovanja:

- Metribuzin spada u grupu triazinona (triazina).
- Korovske biljke ga usvajaju lišćem i korenom. Nakon usvajanja kreće se naviše u biljkama.
- Deluje tako što inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze (fotosistem II).

Primena:

Preparat **LORD 700-WDG** je selektivni, sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje **širokolistnih korova u usevima: krompira, paradajza i soje**:

Krompir:

posle sadnje, a pre nicanja useva, u količinama:

- **0,75 kg/ha** (7,5 g na 100 m²) na slabo humoznim zemljištima (1-3% humusa);
- **1 kg/ha** (10 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5% humusa);
- **1,5 kg/ha** (15 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5% humusa).

posle nicanja useva, kada krompir dostigne visinu 5-10 cm, odnosno kada razvije 5-8 listova (faze 15(105)-18(108) BBCH skale), u količinama:

- **0,5 kg/ha** (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5% humusa);
- **0,75 kg/ha** (7,5 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5% humusa).

Paradajz (samo koji se rasađuje):

8-10 dana posle rasađivanja, u količinama:

- **0,5 kg/ha** (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5% humusa);
- **0,75 kg/ha** (7,5 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5% humusa)



Soja:

posle setve, a pre nicanja useva, u količinama:

- **0,5 kg/ha** (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5% humusa);
- **1 kg/ha** (10 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5% humusa)

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Spektar delovanja:

osetljive korovske vrste su jednogodišnji širokolisni korovi, među kojima su:

lipica teofrastova	<i>Abutilon theophrasti</i>	konica obična	<i>Galinsoga parviflora</i>
ambrozija	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	dvornici	<i>Polygonum spp.</i>
štirovi	<i>Amaranthus spp.</i>	loboda	<i>Atriplex patula</i>
repica crna	<i>Brassica nigra</i>	konica obična	<i>Galinsoga parviflora</i>
pepeljuge	<i>Chenopodium spp.</i>	tušt obični	<i>Portulaca oleracea</i>
lubeničarka	<i>Hibiscus trionum</i>	čistac jednogodišnji	<i>Stachys annua</i>
gorušica	<i>Sinapis arvensis</i>	tatula	<i>Datura stramonium</i>

Lord 700 WDG je herbicid koji, pored delovanja na ostale korovske vrste, ima odlično delovanje na **tatulu, ambroziju, štir, pepeljugu, gorušicu i abutilon**.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

LORD 700-WDG ne sme se primenjivati u sortama krompira Jerla, Voran, SV 77/40 i SV 76/48, i u usevu paradajza iz semena.

Na tretiranim površinama zbog zadržavanja ostataka u zemljištu, najmanje 4 meseca ne gajiti druge useva, naročito kupusnjače, repu, salatu, krastavce i lubenice.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Na istoj površini u toku godine može se primeniti samo jednom.

Karenca:

42 dana za krompir i paradajz.

Obezbeđena vremenom primene za soju.

Pakovanje: 1 kg ; 500 g ; 100 g



Agrimatico